

適応がん種	大腸がん
レジメン名	カペシタビン+ペバシズマブ
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

### 投与スケジュール

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝 夕	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)

\* 1コース21日間を繰り返し行います。

### 内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カペシタビン錠 (商品名:ゼローダ錠)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			<b>*1日目の夕~15日目の朝まで14日間内服</b>

### 注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
ペバシズマブ注 (商品名:アバスチン注)	7.5mg/kg	90分	抗がん剤です

### 副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・吐き気・高血圧・血が出やすくなる・手足症候群 (手足のチクチク・カサカサ) など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

\* カペシタビン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**

**飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。**

<1.36㎡: 2400mg/日

1.36~1.66㎡: 3000mg/日

1.66~1.96㎡: 3600mg/日

1.96㎡<: 4200mg/日

**\*手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。**

\* 鼻血や歯ぐきからの出血を防ぐため、歯磨きや鼻をかむ際は優しく行ってください。