

適応がん種	大腸がん
レジメン名	カペシタビン（術後補助 単独投与）
1コースの日数	21日
投与方法	内服(飲み薬)のみ

投与スケジュール

	1コース(21日)	
	1～14日目	15～21日目
朝	飲み薬	休薬(服用なし)
夕		

* 1コース21日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1日目～14日目まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カペシタビン錠（商品名：ゼローダ錠）	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			*1日目～14日目まで14日間内服

副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・吐き気・手足症候群（手足のチクチク・カサカサ）など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* カペシタビン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**
飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

<1.33㎡: 3000mg/日

1.33～1.57㎡: 3600mg/日

1.57～1.81㎡: 4200mg/日

1.81㎡<: 4800mg/日

* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。