

| | |
|---------|-----------|
| 適応がん種 | 胃・大腸がん |
| レジメン名 | ロンサーフ |
| 1コースの日数 | 28日 |
| 投与方法 | 内服(飲み薬)のみ |

投与スケジュール

| | | | | |
|--------|-----------|-------|--------|---------|
| | 1コース(28日) | | | |
| | 1~5日目 | 6~7日目 | 8~12日目 | 13~28日目 |
| 朝 夕 | 飲み薬 | 休薬 | 飲み薬 | 休薬 |

*1コース28日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1~5日目、8~12日目まで)

| 使用薬剤 | 投与量 | 用法 | 薬効 |
|----------|---------|-----------|--------------------------|
| ロンサーフ配合錠 | 下記備考欄参照 | 1日2回 朝夕食後 | 抗がん剤です |
| | | | *1~5日目、8~12日目のみ内服 |

副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・下痢・便秘・口内炎・吐き気など

*主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

*ロンサーフ配合錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。服用期間には注意してください。

飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

<1.07㎡: 70mg/日

1.07~1.23㎡: 80mg/日

1.23~1.38㎡: 90mg/日

1.38~1.53㎡: 100mg/日

1.53~1.69㎡: 110mg/日

1.69~1.84㎡: 120mg/日

1.84~1.99㎡: 130mg/日

1.99~2.15㎡: 140mg/日

2.15㎡<: 150mg/日

*手洗いなどの感染予防を心がけてください。