

適応がん種	大腸がん
レジメン名	5FU/LV(sLVFU2)+ペバシズマブ
1 コースの日数	14日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

### 投与スケジュール

	1コース(14日)	
	1日目	2～14日目
朝	点滴	休薬

\* 1 コース14日間を繰り返し行います。

### 注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ	3mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ペバシズマブ注 (商品名:アバスチン注)	5mg/kg	90分	抗がん剤です
レボホリナート注	200mg/m <sup>2</sup>	120分	5-FUの働きを助けます
5-FU注 (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	15分	抗がん剤です
5-FU注 (持続静注:インフューザーポンプ)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	抗がん剤です

### 副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・吐き気・高血圧・血が出やすくなるなど

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

**\* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。**

\* 鼻血や歯ぐきからの出血を防ぐため、歯磨きや鼻をかむ際は優しく行ってください。

\* 入浴時にインフューザーポンプの接続部を温める、濡らすなどの行為は避けてください。

\* インフューザーポンプのルートを引っ張る、折り曲げるなどの行為はしないでください。