

適応がん種	大腸がん
レジメン名	CAPIRI+ペバシズマブ
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

投与スケジュール

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

* 1コース21日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カペシタビン錠 (商品名:ゼロータ錠)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			*1日目の夕~15日目の朝まで14日間内服

注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
ペバシズマブ注 (商品名:アバスチン注)	7.5mg/kg	90分	抗がん剤です
イリノテカン注	200mg/m ²	90分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・脱毛 ・下痢 ・便秘 ・吐き気 ・高血圧 ・血が出やすくなる ・手足症候群 (手足のチクチク ・カサカサ) など
--

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* カペシタビン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。 服用期間には注意してください。 飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。 <1.31m ² : 1800mg/日 1.31~1.69m ² : 2400mg/日 1.69~2.07m ² : 3000mg/日 2.07m ² <: 3600mg/日 * 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。 * 下痢がひどい場合、水分補給には注意するようにしてください。 * 鼻血や歯ぐきからの出血を防ぐため、歯磨きや鼻をかむ際は優しく行ってください。
