

適応がん種	大腸がん
レジメン名	CAPIRI
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

**投与スケジュール**

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

\* 1コース21日間を繰り返し行います。

**内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)**

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カペシタビン錠 (商品名:ゼロータ錠)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			<b>*1日目の夕~15日目の朝まで14日間内服</b>

**注射(点滴静注) (1日目のみ)**

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
イリノテカン注	200mg/m <sup>2</sup>	90分	抗がん剤です

**副作用**

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・脱毛 ・下痢 ・便秘 ・吐き気 ・手足症候群 (手足のチクチク・カサカサ) など
---

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

**注意点・備考**

<p>*カペシタビン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。<b>服用期間には注意してください。</b></p> <p><b>飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。</b></p> <p>&lt;1.31m<sup>2</sup>: 1800mg/日</p> <p>1.31~1.69m<sup>2</sup>: 2400mg/日</p> <p>1.69~2.07m<sup>2</sup>: 3000mg/日</p> <p>2.07m<sup>2</sup>&lt;: 3600mg/日</p> <p><b>*手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。</b></p> <p><b>*下痢がひどい場合、水分補給には注意するようにしてください。</b></p>
--