

適応がん種	胃・大腸がん
レジメン名	CapeOX(XELOX)
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

### 投与スケジュール

	1コース(21日)			
	1日目	2～14日目	15日目	16～21日目
朝 夕	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)

\* 1コース21日間を繰り返し行います。

### 内服(飲み薬) (1日目の夕～15日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カペシタビン錠 (商品名：ゼローダ錠)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			<b>*1日目の夕～15日目の朝まで14日間内服</b>

### 注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
オキサリプラチン注	130mg/m <sup>2</sup>	120分	抗がん剤です

### 副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・吐き気・手足症候群 (手足のチクチク・カサカサ) など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

\* カペシタビン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**

**飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。**

<1.36m<sup>2</sup>: 2400mg/日

1.36～1.66m<sup>2</sup>: 3000mg/日

1.66～1.96m<sup>2</sup>: 3600mg/日

1.96m<sup>2</sup><: 4200mg/日

\* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。

\* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。