

適応がん種	胃がん
レジメン名	CapeOX(XELOX)
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

投与スケジュール

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

* 1コース21日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カペシタビン錠 (商品名:ゼロータ錠)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			*1日目の夕~15日目の朝まで14日間内服

注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
オキサリプラチン注	130mg/m ²	120分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・吐き気
 ・手足症候群 (手足のチクチク・カサカサ) など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* カペシタビン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**
飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

<1.36m²: 2400mg/日
 1.36~1.66m²: 3000mg/日
 1.66~1.96m²: 3600mg/日
 1.96m²<: 4200mg/日

* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。
 * 冷たいものに直接接触するのは避けてください。