

適応がん種	大腸がん
レジメン名	IRIS
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

**投与スケジュール**

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

\* 1コース21日間を繰り返し行います。

**内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)**

使用薬剤	投与量	用法	薬効
S1 (商品名: ティーエスワンなど)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			<b>*1日目の夕~15日目の朝まで</b>

**注射(点滴静注) (1日目のみ)**

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
イリノテカン注	150mg/m <sup>2</sup>	90分	抗がん剤です

**副作用**

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・脱毛・下痢・便秘・吐き気・指先の皮膚着色など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

**注意点・備考**

\* S1は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**

**飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。**

<1.25m<sup>2</sup>: 80mg/日

1.25~1.5m<sup>2</sup>: 100mg/日

1.5m<sup>2</sup><: 120mg/日

\* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

\* 下痢がひどい場合、水分補給には注意するようにしてください。