

適応がん種	胃がん
レジメン名	S1+DTX
1 コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注) + 内服(飲み薬)

投与スケジュール

・初回のみ

1コース(21日)				
	1日目	2～14日目	15日目	16～21日目
朝	服用なし	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

・2～7コース目

1コース(21日)				
	1日目	2～14日目	15日目	16～21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

・8コース目以降

1コース(42日)				
	1日目	2～28日目	29日目	30～42日目
朝	服用なし	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

*回数により1コースの日数が大幅に変動します。

内服(飲み薬) (上記投与スケジュール参照)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
S1 (商品名: ティーエスワンなど)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です

注射(点滴静注) (2～7コース目の1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ドセタキセル注	40mg/m ²	60分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・吐き気
・浮腫 (むくみ) ・脱毛など

*主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* S1は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**

飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

< 1.25m²: 80mg/日

1.25～1.5m²: 100mg/日

1.5m²<: 120mg/日

* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。

* 冷たいものに直接触るのは避けてください。

* **初回と8コース目以降は飲み薬のみと変則的な投与方法となります。**