

適応がん種	胃がん
レジメン名	SOX+T-mab
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

投与スケジュール

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

* 1コース21日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
S1 (商品名: ティーエスワンなど)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			*1日目の夕~15日目の朝まで

注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
トラスツズマブ注	6~8mg/kg	90分	抗がん剤です
オキサリプラチン注	130mg/m ²	120分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・吐き気 ・指先の皮膚着色など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* S1は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**

飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

<1.25m²: 80mg/日

1.25~1.5m²: 100mg/日

1.5m²<: 120mg/日

*** 手洗いなどの感染予防を心がけてください。**

*** 冷たいものに直接触るのは避けてください。**