

適応がん種	胃がん
レジメン名	T-mab・CapeOX(HER・XELOX)
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

**投与スケジュール**

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

\* 1コース21日間を繰り返し行います。

**内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)**

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カペシタビン錠 (商品名:ゼロータ錠)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			<b>*1日目の夕~15日目の朝まで14日間内服</b>

**注射(点滴静注) (1日目のみ)**

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
トラスツズマブ注	6~8mg/kg	90分	抗がん剤です
オキサリプラチン注	130mg/m <sup>2</sup>	120分	抗がん剤です

**副作用**

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・吐き気 ・手足症候群 (手足のチクチク・カサカサ) など
--

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

**注意点・備考**

<p>* カペシタビン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。<b>服用期間には注意してください。</b>  <b>飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。</b></p> <p>&lt;1.36m<sup>2</sup>: 2400mg/日          1.36~1.66m<sup>2</sup>: 3000mg/日          1.66~1.96m<sup>2</sup>: 3600mg/日          1.96m<sup>2</sup>&lt;: 4200mg/日</p> <p>* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。          * 冷たいものに直接触るのは避けてください。</p>
--