

適応がん種	大腸がん
レジメン名	ロンサーフ+ペバシズマブ
1コースの日数	28日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

投与スケジュール

	1コース(28日)									
	1日目	2~5日目	6日目	7日目	8日目	9~12日目	13日目	14日目	15日目	16~28日目
朝	点滴	飲み薬		休薬		飲み薬		休薬	点滴	休薬
夕										

*1コース28日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1日目の夕~6日目の朝、8日目の夕~13日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
ロンサーフ配合錠	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
*1日目の夕~6日目の朝、8日目の夕~13日目の朝 のみ内服			

注射(点滴静注) (1、15日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
ペバシズマブ注 (商品名: アバスチン注)	5mg/kg	90分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・下痢・便秘・口内炎・吐き気・高血圧・血が出やすくなるなど

*主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

*ロンサーフ配合錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。服用期間には注意してください。

飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

- <1.07㎡: 70mg/日
- 1.07~1.23㎡: 80mg/日
- 1.23~1.38㎡: 90mg/日
- 1.38~1.53㎡: 100mg/日
- 1.53~1.69㎡: 110mg/日
- 1.69~1.84㎡: 120mg/日
- 1.84~1.99㎡: 130mg/日
- 1.99~2.15㎡: 140mg/日
- 2.15㎡<: 150mg/日

*手洗いなどの感染予防を心がけてください。

*鼻血や歯ぐきからの出血を防ぐため、歯磨きや鼻をかむ際は優しく行ってください。