

県立志摩病院 薬剤部 化学療法

適応がん種	胃・大腸がん
レジメン名	ロンサーフ
1コースの日数	28日
投与方法	内服(飲み薬)のみ

投与スケジュール

	1コース(28日)			
	1~5日目	6~7日目	8~12日目	13~28日目
朝 夕	飲み薬	休薬	飲み薬	休薬

*1コース28日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1~5日目、8~12日目まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
ロンサーフ配合錠	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です
			*1~5日目、8~12日目のみ内服

副作用

骨髄抑制(風邪をひきやすくなるなど)・下痢・便秘・口内炎・吐き気など

*主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

*ロンサーフ配合錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。

服用期間には注意してください。

飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

<1.07㎡: 70mg/日

1.07~1.23㎡: 80mg/日

1.23~1.38㎡: 90mg/日

1.38~1.53㎡: 100mg/日

1.53~1.69㎡: 110mg/日

1.69~1.84㎡: 120mg/日

1.84~1.99㎡: 130mg/日

1.99~2.15㎡: 140mg/日

2.15㎡<: 150mg/日

***手洗いなどの感染予防を心がけてください。**