

適応がん種	胃
レジメン名	mFOLFOX6+Tmab
1 コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

### 投与スケジュール

	1コース(21日)	
	1日目	2～21日目
朝	点滴	休薬

\* 1コース21日間を繰り返し行います。

### 注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
トラスツズマブ注	6～8mg/kg	90分	抗がん剤です
オキサリプラチン注	85mg/m <sup>2</sup>	120分	抗がん剤です
レボホリナート注	200mg/m <sup>2</sup>	120分	5-FUの働きを助けます
5-FU注 (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	15分	抗がん剤です
5-FU注 (持続静注:インフューザーポンプ)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	抗がん剤です

### 副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・動悸・吐き気など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

\* **手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。**

\* **冷たいものに直接接触するのは避けてください。**

\* 入浴時にインフューザーポンプの接続部を温める、濡らすなどの行為は避けてください。

\* インフューザーポンプのルートを引っ張る、折り曲げるなどの行為はしないでください。

\* 心臓に持病のある方は主治医に相談してください。