

適応がん種	胃がん
レジメン名	nab-PTX+サイラムザ
1コースの日数	28日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

投与スケジュール

1コース(28日)						
1日目	2～7日目	8日目	9～14日目	15日目	16～28日目	
点滴	休薬	点滴	休薬	点滴	休薬	

* 1コース28日間を繰り返し行います。

* 1、15日目はサイラムザとアブラキサンの両方を、8日目はアブラキサンのみ投与します。

注射(点滴静注) (1、15日目：サイラムザ+アブラキサン)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
サイラムザ注	8mg/kg	60分	抗がん剤です
アブラキサン注	100mg/m ²	30分	抗がん剤です

注射(点滴静注) (8日目：アブラキサンのみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
アブラキサン注	100mg/m ²	30分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・脱毛・吐き気・便秘・下痢・高血圧・血が出やすくなるなど

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* 1,15日目は点滴開始前にレスタミンコーワ錠10mg 5錠（アレルギー予防薬）を服用します。

* レスタミン錠服用時は眠気がありますので、運転等には注意してください。

* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。

* アブラキサン注は特定生物由来製品（原材料に人血液を使用した製品）です。