

適応がん種	胃がん
レジメン名	weeklyPTX+サイラムザ
1コースの日数	28日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

### 投与スケジュール

1コース(28日)						
1日目	2～7日目	8日目	9～14日目	15日目	16～28日目	
点滴	休薬	点滴	休薬	点滴	休薬	

\* 1コース28日間を繰り返し行います。

\* 1、15日目はサイラムザとパクリタキセルの両方を、8日目はパクリタキセルのみ投与します。

### 注射(点滴静注) (1、15日目：サイラムザ+パクリタキセル)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ	3mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ファモチジン注	20mg		
サイラムザ注	8mg/kg	60分	抗がん剤です
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	60分	抗がん剤です

### 注射(点滴静注) (8日目：パクリタキセルのみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ	3mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ファモチジン注	20mg		
観察期間		30分	
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	60分	抗がん剤です

### 副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・脱毛・吐き気・便秘・下痢・高血圧・血が出やすくなるなど

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

\* **パクリタキセル注にアルコールが含まれていますので、点滴を受けた後に運転はしないでください。**

\* **アルコールに過敏な方はお申し出ください。**

\* **点滴開始前にレスタミンコーワ錠10mg 5錠（アレルギー予防薬）を服用します。**

\* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

\* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。