

適応がん種	乳がん
レジメン名	アブラキサン+テセントリク
1コースの日数	28日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

### 投与スケジュール

1コース(28日)						
1日目	2～7日目	8日目	9～14日目	15日目	16～28日目	
点滴	休薬	点滴	休薬	点滴	休薬	

\* 1コース28日間を繰り返し行います。

**\*1、15日目はアブラキサンとテセントリクの両方を、8日目はアブラキサンのみ投与します。**

### 注射(点滴静注) (1、15日目：アブラキサン+テセントリク)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
テセントリク注	840mg	30分 (初回のみ60分)	抗がん剤です
アブラキサン注	100mg/m <sup>2</sup>	30分	抗がん剤です

### 注射(点滴静注) (8日目：アブラキサンのみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
アブラキサン注	100mg/m <sup>2</sup>	30分	抗がん剤です

### 副作用

倦怠感・のどが渇く・頻尿・下痢・便秘・吐き気・息切れ・咳・寒気・骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・脱毛など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

**\* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。**

\* 通常の抗がん剤より副作用は少なめですが、免疫に働く薬剤の特徴による副作用があります。

\* 副作用の早期発見・予防のため、投与中は少しでも変わった自覚症状があれば申し出るようにしてください。

**\* 特にのどの渇き、頻尿、下痢が続く、息切れがする、という症状があれば直ちに申し出てください。**