

| | |
|---------|------------------|
| 適応がん種 | 前立腺がん |
| レジメン名 | ジェブタナ |
| 1コースの日数 | 21日 |
| 投与方法 | 注射(点滴静注)+内服(飲み薬) |

投与スケジュール

| | | |
|--|-----------|--------|
| | 1コース(21日) | |
| | 1日目 | 2~21日目 |
| | 点滴 | 休薬 |

* 1コース21日間を繰り返していきます。

注射(点滴静注) (1日目のみ)

| 使用薬剤 | 投与量 | 投与時間 | 薬効 |
|---|-----------------------------|------|---------------|
| グラニセトロンバッグ デキサート注 ファモチジン注 ポララミン注 | 3mg 6.6mg 20mg 5mg | 15分 | 吐き気止め・アレルギー予防 |
| 生食注 | 100mL | 30分 | 輸液です |
| ジェブタナ注 | 25mg/m ² | 60分 | 抗がん剤です |

内服(飲み薬) (連日)

| 使用薬剤 | 投与量 | 用法 | 薬効 |
|-------------|-------|-------|---------|
| プレドニゾロン錠5mg | 1回 1錠 | 1日 2回 | ステロイドです |

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・脱毛 ・吐き気 ・便秘 ・下痢 ・味覚異常など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

*** ジェブタナ注にアルコールが含まれていますので、点滴を受けた後に運転はしないでください。**

*** 手洗いなどの感染予防を心がけてください。**

* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。