

適応がん種	膀胱・腎盂・尿管・前立腺がん
レジメン名	CDDP-A法
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

投与スケジュール

	1コース(21日)	
	1～5日目	6～21日目
朝	点滴	休薬

* 1コース21日間を繰り返し行います。

注射(点滴静注) (1～5日目)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
生食注	1L	600分	副作用防止のための輸液です
グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
シスプラチン注	20mg/m²	120分	抗がん剤です
マンニトールS注	300mL	120分	副作用防止のための利尿剤です
生食注	1.5L	720分	副作用防止のための輸液です

副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・吐き気・便秘・脱毛・聴力障害など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

- * 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。
- * 冷たいものに直接接触するのは避けてください。
- * 点滴終了後、音の聞こえ方に変化がある場合は申し出てください。
- * 副作用防止のため、抗がん剤投与前後に大量の輸液を投与します。そのため数日間入院が必要となります。**