

適応がん種	胆管がん
レジメン名	GEM+S1
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

投与スケジュール

		1コース(21日)					
		1日目	2～7日目	8日目	9～14日目	15日目	16～21日目
朝	点滴		飲み薬	点滴+飲み薬	飲み薬		休薬(服用なし)
夕							

* 1コース21日間を繰り返し行います

内服(飲み薬) (1日目の朝～15日目の朝)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
S1 (商品名: ティーエスワンなど)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です

注射(点滴静注) (1、8日目)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ゲムシタピン注	1000mg/m²	30分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・吐き気・下痢・口内炎・皮疹・疲労感・血管痛・目の充血など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

<p>* S1は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。 服用期間には注意してください。</p> <p>飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。</p> <p><1.25m²: 60mg/日</p> <p>1.25～1.5m²: 80mg/日</p> <p>1.5m²<: 100mg/日</p> <p>* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。</p>
