

適応がん種	胆管がん
レジメン名	GEM・CDDP
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

**投与スケジュール**

1コース(21日)			
1日目	2～7日目	8日目	9～21日目
点滴	休薬	点滴	休薬

\* 1コース21日間を繰り返し行います。

**内服(飲み薬)**

使用薬剤	投与量	用法	薬効
デキサメタゾン錠0.5mg (商品名:デカドロン錠)	1回 8錠	1日2回 朝夕食後	吐き気止め・アレルギー予防
			<b>*2～3日目、9～10日目のみ服用</b>

**注射(点滴静注) (1、8日目)**

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
生食注	500mL	60分	副作用防止のための輸液です
パロノセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 6.6mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
<b>シスプラチン注</b>	<b>25mg/m<sup>2</sup></b>	<b>60分</b>	<b>抗がん剤です</b>
ラシックス	10mg	1分	副作用防止のための利尿剤です
生食注	500mL	60分	副作用防止のための輸液です
<b>ゲムシタビン注</b>	<b>1000mg/m<sup>2</sup></b>	<b>30分</b>	<b>抗がん剤です</b>

**副作用**

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・吐き気・便秘・脱毛・聴力障害・血管痛など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

**注意点・備考**

- \* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。
- \* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。
- \* 点滴終了後、音の聞こえ方に变化がある場合は申し出てください。
- \* **副作用防止のため、抗がん剤投与前後に輸液を投与します。**