

適応がん種	膵臓がん
レジメン名	GEM・nab-PTX
1コースの日数	28日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

### 投与スケジュール

1コース(28日)						
1日目	2～7日目	8日目	9～14日目	15日目	16～28日目	
点滴	休薬	点滴	休薬	点滴	休薬	

\* 1コース28日間を繰り返し行います。

### 注射(点滴静注) (1、8、15日目)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
アブラキサン注	125mg/m <sup>2</sup>	30分	抗がん剤です
ゲムシタピン注	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	抗がん剤です

### 副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・脱毛・吐き気・便秘・下痢・血管痛など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

### 注意点・備考

\* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

\* 冷たいものに直接触るのは避けてください。

\* アブラキサン注は特定生物由来製品（原材料に人血液を使用した製品）です。