

適応がん種	乳がん
レジメン名	weeklyPTX+ペバシズマブ
1コースの日数	28日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

投与スケジュール

1コース(28日)						
1日目	2～7日目	8日目	9～14日目	15日目	16～28日目	
点滴	休薬	点滴	休薬	点滴	休薬	

* 1コース28日間を繰り返し行います。

* 1、15日目はペバシズマブとパクリタキセルの両方を、8日目はパクリタキセルのみ投与します。

注射(点滴静注) (1、15日目：ペバシズマブ+パクリタキセル)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ デキサート注 ファモチジン注	3mg 6.6mg 20mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
観察期間	-	30分	
ペバシズマブ注	10mg/kg	90分	抗がん剤です
パクリタキセル注	90mg/m ²	60分	抗がん剤です

注射(点滴静注) (8日目：パクリタキセルのみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ デキサート注 ファモチジン注	3mg 6.6mg 20mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
観察期間		30分	
パクリタキセル注	90mg/m ²	60分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・脱毛・吐き気・便秘・下痢・高血圧・血が出やすくなるなど

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* **パクリタキセル注にアルコールが含まれていますので、点滴を受けた後に運転はしないでください。**

* **アルコールに過敏な方はお申し出ください。**

* **点滴開始前にレスタミンコーワ錠10mg 5錠（アレルギー予防薬）を服用します。**

* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。