

適応がん種	胃がん
レジメン名	Cape + CDDP
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注) + 内服(飲み薬)

投与スケジュール

	1コース(21日)			
	1日目	2~14日目	15日目	16~21日目
朝	点滴	飲み薬		休薬(服用なし)
夕				

* 1コース21日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1日目の夕~15日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
カベシタピン錠 (商品名:ゼローダ錠)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です *1日目の夕~15日目の朝まで
オランザピン錠5mg (商品名:ジプレキサ錠)	1回 1錠	1日1回 夕食後	吐き気止め(1~4日目のみ)
デキサメタゾン錠0.5mg (商品名:デカドロン錠)	1回 8錠	1日2回 朝夕食後	吐き気止め・アレルギー予防 (2~3日目のみ)

注射(点滴静注) (1日目~)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
ソルデム3A	1.5L	270分	副作用防止のための輸液です
パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分	吐き気止め・アレルギー予防
アロカリス注	235mg		
デキサート注	9.9mg		
シスプラチン注	80mg/m²	120分	抗がん剤です
ラシックス注	10mg	1分	副作用防止のための利尿剤です
ソルデム3A	1L	240分	副作用防止のための輸液です
10%塩化ナトリウム注			
ソルデム3A	合計2.5L程度	60時間	副作用防止のための輸液です

副作用

骨髄抑制(風邪をひきやすくなるなど)・末梢神経障害(手足のびりびり)・吐き気・便秘・脱毛
 ・手足症候群(手足のチクチク・カサカサ)・聴力障害など

*主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

*カベシタピン錠は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。**服用期間には注意してください。**

飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

<1.36m²: 2400mg/日

1.36~1.66m²: 3000mg/日

1.66~1.96m²: 3600mg/日

1.96m²<: 4200mg/日

*手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。

*冷たいものに直接接触するのは避けてください。

*点滴終了後、音の聞こえ方に変化がある場合は申し出てください。

***副作用防止のため、1日目の抗がん剤投与前後に大量の輸液を投与します。そのため数日間入院が必要となります。**