

| | |
|---------|------------|
| 適応がん種 | 乳がん |
| レジメン名 | AC |
| 1コースの日数 | 21日 |
| 投与方法 | 注射(点滴静注)のみ |

投与スケジュール

| | | |
|---|-----------|--------|
| | 1コース(21日) | |
| | 1日目 | 2~21日目 |
| 朝 | 点滴 | 休薬 |

* 1コース21日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬)

| 使用薬剤 | 投与量 | 用法 | 薬効 |
|-------------------------|-------|----------|----------------|
| オランザピン錠5mg (商品名:ジプレキサ錠) | 1回 1錠 | 1日1回 夕食後 | 吐き気止め(1~4日目のみ) |

注射(点滴静注) (1日目のみ)

| 使用薬剤 | 投与量 | 投与時間 | 薬効 |
|------------|----------------------|------|---------------|
| パロノセトロンバッグ | 0.75mg | 30分 | 吐き気止め・アレルギー予防 |
| アロカリス注 | 235mg | | |
| デキサート注 | 9.9mg | | |
| アドリアシン注 | 60mg/m ² | 15分 | 抗がん剤です |
| エンドキサン注 | 600mg/m ² | 30分 | 抗がん剤です |

副作用

骨髄抑制(風邪をひきやすくなるなど)・脱毛・下痢・便秘・吐き気・膀胱炎など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。

* 飲水を心がけてください。

* 尿の色が赤くなる場合があります。痛みがあるような場合は医師に申し出るようにしてください。