

適応がん種	乳がん
レジメン名	FEC
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

投与スケジュール

	1コース(21日)	
	1日目	2～21日目
朝	点滴	休薬

* 1コース21日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
オランザピン錠5mg (商品名:ジブレキサ錠)	1回 1錠	1日1回 夕食後	吐き気止め(1～4日目のみ)
デキサメタゾン錠0.5mg (商品名:デカドロン錠)	1回 8錠	1日2回 朝夕食後	吐き気止め・アレルギー予防(2～3日目のみ)

注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分	吐き気止め・アレルギー予防
アロカリス注	235mg		
デキサート注	9.9mg		
エビルピシン注	100mg/m ²	15分	抗がん剤です
5-FU注	500mg/m ²	120分	抗がん剤です
エンドキサン注	500mg/m ²		

副作用

骨髄抑制(風邪をひきやすくなるなど)・末梢神経障害(手足のびりびり)・脱毛・下痢・便秘・吐き気・膀胱炎など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

<p>* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。</p> <p>* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。</p> <p>* 飲水を心がけてください。</p> <p>* 尿の色が赤くなる場合があります。痛みがあるような場合は医師に申し出るようにしてください。</p>
