

適応がん種	胃がん
レジメン名	S1・CDDP
1コースの日数	35日
投与方法	注射(点滴静注)+内服(飲み薬)

投与スケジュール

	1コース(35日)					
	1日目	2~7日目	8日目	9~21日目	22日目	23~35日目
朝 夕	休薬	飲み薬	点滴+飲み薬			休薬(服用なし)

* 1コース35日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬) (1日目の夕~22日目の朝まで)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
S1 (商品名: ティーエスワンなど)	下記備考欄参照	1日2回 朝夕食後	抗がん剤です *1日目の夕~22日目の朝まで
オランザピン錠5mg (商品名: ジブレキサ錠)	1回 1錠	1日1回 夕食後	吐き気止め(8~11日目のみ)
デキサメタゾン錠0.5mg (商品名: デカドロン錠)	1回 8錠	1日2回 朝夕食後	吐き気止め・アレルギー予防 (9~10日目のみ)

注射(点滴静注) (8日目~)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
ソルデム3A	1.5L	270分	副作用防止のための輸液です
パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分	吐き気止め・アレルギー予防
アロカリス注	235mg		
デキサート注	9.9mg		
シスプラチン注	60mg/m ²	120分	抗がん剤です
ラシックス注	10mg	1分	副作用防止のための利尿剤です
ソルデム3A	1L	240分	副作用防止のための輸液です
10%塩化ナトリウム注			
ソルデム3A	合計2.5L程度	60時間	副作用防止のための輸液です

副作用

骨髄抑制(風邪をひきやすくなるなど)・末梢神経障害(手足のびりびり)・吐き気・便秘・脱毛・聴力障害など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* S1は体表面積により、下記の通り投与量を調節して投与します。服用期間には注意してください。

飲み忘れの場合は2回分を一度に飲まないでください。

< 1.25m²: 80mg/日

1.25~1.5m²: 100mg/日

1.5m²<: 120mg/日

* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。

* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。

* 点滴終了後、音の聞こえ方に变化がある場合は申し出てください。

*** 副作用防止のため、8日目の抗がん剤投与前後に大量の輸液を投与します。そのため数日間入院が必要となります。**