

適応がん種	膵臓がん
レジメン名	FOLFIRINOX
1コースの日数	14日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

投与スケジュール

	1コース(14日)	
	1日目	2~14日目
朝	点滴	休薬

* 1コース14日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
オランザピン錠5mg (商品名:ジブレキサ錠)	1回 1錠	1日1回 夕食後	吐き気止め(1~4日目のみ)
デキサメタゾン錠0.5mg (商品名:デカドロン錠)	1回 8錠	1日2回 朝夕食後	吐き気止め・アレルギー予防(2~3日目のみ)

注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ アロカリス注 デキサート注	0.75mg 235mg 9.9mg	30分	吐き気止め・アレルギー予防
オキサリプラチン注	85mg/m ²	120分	抗がん剤です
イリノテカン注	180mg/m ²	90分	抗がん剤です
レポホリナート注	200mg/m ²	120分	5-FUの働きを助けます
5-FU注 (急速静注)	400mg/m ²	15分	抗がん剤です
5-FU注 (持続静注:インフューザーポンプ)	2400mg/m ²	46時間	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制(風邪をひきやすくなるなど)・末梢神経障害(手足のびりびり)・脱毛・下痢・便秘・吐き気など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

- * 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。
- * 冷たいものに直接接触するのは避けてください。
- * 下痢がひどい場合、水分補給には注意するようにしてください。
- * 入浴時にインフューザーポンプの接続部を温める、濡らすなどの行為は避けてください。
- * インフューザーポンプのルートを引っ張る、折り曲げるなどの行為はしないでください。