

| | |
|----------|---------------------|
| 適応がん種 | 大腸がん |
| レジメン名 | mFOLFOXIRI + ベバシズマブ |
| 1 コースの日数 | 14日 |
| 投与方法 | 注射(点滴静注)のみ |

投与スケジュール

| | | |
|---|-----------|--------|
| | 1コース(14日) | |
| | 1日目 | 2~14日目 |
| 朝 | 点滴 | 休薬 |

* 1 コース14日間を繰り返し行います。

内服(飲み薬)

| 使用薬剤 | 投与量 | 用法 | 薬効 |
|----------------------------|-------|-----------|-------------------------|
| オランザピン錠5mg (商品名:ジプレキサ錠) | 1回 1錠 | 1日1回 夕食後 | 吐き気止め(1~4日目のみ) |
| デキサメタゾン錠0.5mg (商品名:デカドロン錠) | 1回 8錠 | 1日2回 朝夕食後 | 吐き気止め・アレルギー予防 (2~3日目のみ) |

注射(点滴静注) (1日目のみ)

| 使用薬剤 | 投与量 | 投与時間 | 薬効 |
|-------------------------|-----------------------|------|---------------|
| パロノセトロンバッグ | 0.75mg | 30分 | 吐き気止め・アレルギー予防 |
| アロカリス注 | 235mg | | |
| デキサート注 | 9.9mg | | |
| ベバシズマブ注 (商品名:アバスチン注) | 5mg/kg | 90分 | 抗がん剤です |
| イリノテカン注 | 150mg/m ² | 60分 | 抗がん剤です |
| オキサリプラチン注 | 85mg/m ² | 120分 | 抗がん剤です |
| レボホリナート注 | 200mg/m ² | 120分 | 5-FUの働きを助けます |
| 5-FU注 (持続静注:インフューザーポンプ) | 2400mg/m ² | 46時間 | 抗がん剤です |

副作用

| |
|---|
| 骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・脱毛 ・下痢 ・便秘 ・吐き気 ・高血圧 ・血が出やすくなるなど |
|---|

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

| |
|--|
| <p>* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。</p> <p>* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。</p> <p>* 下痢がひどい場合、水分補給には注意するようにしてください。</p> <p>* 鼻血や歯ぐきからの出血を防ぐため、歯磨きや鼻をかむ際は優しく行ってください。</p> <p>* 入浴時にインフューザーポンプの接続部を温める、濡らすなどの行為は避けてください。</p> <p>* インフューザーポンプのルートを引っ張る、折り曲げるなどの行為はしないでください。</p> |
|--|