

適応がん種	乳がん
レジメン名	ddAC
1コースの日数	14日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

投与スケジュール

	1コース(14日)	
	1日目	2~14日目
朝	点滴	休薬

* 1コース14日間を繰り返し行います。2~4日目のいずれかでペグフィルグラスチム注を投与します。

内服(飲み薬)

使用薬剤	投与量	用法	薬効
オランザピン錠5mg (商品名：ジプレキサ錠)	1回 1錠	1日1回 夕食後	吐き気止め (1~4日目のみ)

注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分	吐き気止め・アレルギー予防
アロカリス注	235mg		
デキサート注	9.9mg		
アドリアシン注	60mg/m ²	15分	抗がん剤です
エンドキサン注	600mg/m ²	30分	抗がん剤です

注射(皮下注) (2~4日目のいずれか)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
ペグフィルグラスチム注 (商品名：ジールスタ注)	3.6mg	1分程度	好中球が下がらないようにするお薬です。

副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・脱毛 ・下痢 ・便秘 ・吐き気 ・膀胱炎など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

<p>* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。</p> <p>* 飲水を心がけてください。</p> <p>* 尿の色が赤くなる場合があります。痛みがあるような場合は医師に申し出るようにしてください。</p>
