

適応がん種	乳がん
レジメン名	ddPTX
1 コースの日数	14日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

#### 投与スケジュール

	1コース(14日)	
	1日目	2~14日目
朝	点滴	休薬

\* 1コース14日間を繰り返し行います。2~4日目のいずれかでペグフィルグラスチム注を投与します。

#### 注射(点滴静注) (1日目のみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ	3mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ファモチジン注	20mg		
観察期間		30分	
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	180分	抗がん剤です

#### 注射(皮下注) (2~4日目のいずれか)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
ペグフィルグラスチム注 (商品名: ジーラスト注)	3.6mg	1分程度	好中球が下がらないようにするお薬です。

#### 副作用

骨髄抑制 (風邪をひきやすくなるなど) ・末梢神経障害 (手足のびりびり) ・脱毛 ・吐き気 ・便秘 ・下痢など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

#### 注意点・備考

\* **パクリタキセル注にアルコールが含まれていますので、点滴を受けた後に運転はしないでください。**

\* **アルコールに過敏な方はお申し出ください。**

\* **点滴開始前にレスタミンコーワ錠10mg 5錠 (アレルギー予防薬) を服用します。**

\* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

\* 冷たいものに直接触るのは避けてください。