

適応がん種	乳がん
レジメン名	キイトルーダ+wPTX+CBDCA
1コースの日数	21日
投与方法	注射(点滴静注)のみ

投与スケジュール

1コース(21日)						
1日目	2～7日目	8日目	9～14日目	15日目	16～21日目	
点滴	休薬	点滴	休薬	点滴	休薬	

* 1コース21日間を繰り返し行います。

* **8日目・15日目はパクリタキセルのみ投与します。**

注射(点滴静注) (1日目：キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分	吐き気止め・アレルギー予防
アロカリス注	235mg		
デキサート注	9.9mg		
ファモチジン注	20mg		
キイトルーダ	200mg	30分	抗がん剤です
パクリタキセル注	80mg/m ²	60分	抗がん剤です
カルボプラチン注	AUC：5	60分	抗がん剤です

注射(点滴静注) (8日目・15日目：パクリタキセルのみ)

使用薬剤	投与量	投与時間	薬効
グラニセトロンバッグ	3mg	15分	吐き気止め・アレルギー予防
デキサート注	6.6mg		
ファモチジン注	20mg		
観察期間		30分	
パクリタキセル注	80mg/m ²	60分	抗がん剤です

副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・末梢神経障害（手足のびりびり）・脱毛・吐き気・便秘・倦怠感・のどが渇く・下痢・息切れ・咳など

* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

注意点・備考

* **パクリタキセル注にアルコールが含まれていますので、点滴を受けた後に運転はしないでください。**

* **アルコールに過敏な方はお申し出ください。**

* **点滴開始前にレスタミンコーワ錠10mg 5錠（アレルギー予防薬）を服用します。**

* 手洗いなどの感染予防を心がけてください。

* 冷たいものに直接接触するのは避けてください。

* 免疫に働く薬剤の特徴による副作用があります。

* 副作用の早期発見・予防のため、投与中は少しでも変わった自覚症状があれば申し出るようにしてください。

* 特にのどの渇き、頻尿、下痢が続く、息切れがする、という症状があれば直ちに申し出てください。