

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 適応がん種    | 大腸がん            |
| レジメン名    | CPT-11+ベクティビックス |
| 1 コースの日数 | 14日             |
| 投与方法     | 注射(点滴静注)のみ      |

#### 投与スケジュール

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
|   | 1コース(14日) |        |
|   | 1日目       | 2～14日目 |
| 朝 | 点滴        | 休薬     |

\* 1 コース14日間を繰り返し行います。

#### 注射(点滴静注) (1日目のみ)

| 使用薬剤                 | 投与量                  | 投与時間 | 薬効            |
|----------------------|----------------------|------|---------------|
| パロノセトロンバッグ<br>デキサート注 | 0.75mg<br>6.6mg      | 15分  | 吐き気止め・アレルギー予防 |
| ベクティビックス注            | 6mg/kg               | 60分  | 抗がん剤です        |
| イリノテカン注              | 150mg/m <sup>2</sup> | 120分 | 抗がん剤です        |

#### 副作用

骨髄抑制（風邪をひきやすくなるなど）・脱毛・下痢・便秘・吐き気・吹き出物・皮膚乾燥・ひび割れ・爪の周りの炎症など

\* 主な副作用を記載しています。副作用の現れ方や頻度には個人差があります。

#### 注意点・備考

\* 手洗いなどの感染予防・手足の保湿を心がけてください。

\* 下痢がひどい場合、水分補給には注意するようにしてください。

\* 皮膚障害予防のため、皮膚を清潔に保ち、刺激の強い衣類を避ける、保湿を行うなどの注意が必要です。